

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 125 «Яблонька»

Птицы Нижегородской области.

Подготовил: Жукова А. П.
воспитатель первой
квалификационной категории

г. Дзержинск, 2021 г.

**НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗОБИЛУЕТ РАЗНООБРАЗИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА.
МНЕ ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ О ПТИЦАХ РОДНОЙ ОБЛАСТИ.**



Во время весенних и осенних перелетов спускаются на озера области лебеди и дикие гуси.

Лебеди:



ДИКИЕ ГУСИ:



ИЗ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ В ЗАВОЛЖСКИХ ЛЕСАХ ВОДЯТСЯ ГЛУХАРИ, ТЕТЕРЕВА, РЯБЧИКИ.

ГЛУХАРЬ (ЛАТ. TETRAO UROGALLUS) — КРУПНАЯ ПТИЦА ИЗ СЕМЕЙСТВА ФАЗАНОВЫХ, ОТРЯДА КУРООБРАЗНЫХ. НАЗВАНИЕМ «ГЛУХАРЬ» ПТИЦА ОБЯЗАНА ИЗВЕСТНОЙ ОСОБЕННОСТИ ТОКУЮЩЕГО В БРАЧНЫЙ ПЕРИОД САМЦА УТРАЧИВАТЬ ЧУТКОСТЬ И БДИТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕМ ЧАСТО ПОЛЬЗУЮТСЯ ОХОТНИКИ.



ТЕТЕРЕВА — РОД ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ФАЗАНОВЫХ.



**РЯБЧИК (ЛАТ. *BONASA BONASIA*) — ПТИЦА ИЗ
РОДА РЯБЧИКОВ, ПОДСЕМЕЙСТВА ТЕТЕРЕВИНЫХ,
ОТРЯДА КУРООБРАЗНЫХ.**



В ЗАРОСЛЯХ БЛИЗ РЕК ПОЮТ СОЛОВЬИ, А НАД РЕКАМИ СЛЫШИТСЯ КРИК РЕЧНЫХ ЧАЕК, ПО ЛЕСАМ РАЗНОСИТСЯ СТУК ДЯТЛОВ, ДОЛБЯЩИХ СВОИМИ КРЕПКИМИ КЛЮВАМИ СТОЛЫ ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

СОЛОВЬИ, (ЛАТ. LUSCINIA) — РОД ПТИЦ ИЗ ОТРЯДА ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ .



**ЧАЙКИ (ЛАТ. LARUS) — НАИБОЛЕЕ
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ РОД ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ЧАЙКОВЫХ, ОБИТАЮЩИХ
КАК НА МОРСКИХ ПРОСТОРАХ, ТАК И НА ВНУТРЕННИХ ВОДОЁМАХ.**



**ДЯТЛЫ (PICI) - ОТРЯД ПТИЦ, ПРЕЖДЕ ПРИЧИСЛЯВШИХСЯ К
ЛАЗАЮЩИМ.**



**ПО ОЗЕРАМ И БОЛОТАМ ГНЕЗДЯТСЯ УТКИ, КУЛИКИ, ЦАПЛИ.
УТКА:**



**КУЛИК (LIMICOLAE), ПОДОТРЯД ПТИЦ ОТРЯДА
РЖАНКООБРАЗНЫХ.**



СЕРАЯ ЦАПЛЯ (ЛАТ. ARDEA CINEREA) — КРУПНАЯ БОЛОТНАЯ ПТИЦА СЕМЕЙСТВА ЦАПЛЕВЫХ



ОКОЛО ЖИЛЬЯ ОБИТАЮТ - ВОРОБЬИ, СКВОРЦЫ, ЛАСТОЧКИ, СТРИЖИ, СИЗЫЕ ГОЛУБИ, ГРАЧИ.

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ (PASSER DOMESTICUS) – НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ВИД РОДА НАСТОЯЩИХ ВОРОБЬЁВ СЕМЕЙСТВА ВОРОБЬИНЫХ .



СКВОРЕЦ (ЛАТ. STURNUS) — ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЙ РОД ПЕВЧИХ ПТИЦ ИЗ СЕМЕЙСТВА СКВОРЦОВЫХ.



**ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА, ИЛИ ВОРОНОК (ЛАТ. DELICHOON
URBICUM) — МЕЛКАЯ ПТИЦА СЕМЕЙСТВА ЛАСТОЧКОВЫХ.**



ЧЁРНЫЙ СТРИЖ, ИЛИ БАШЕННЫЙ СТРИЖ (ЛАТ. APUS APUS) — НЕБОЛЬШАЯ ПТИЦА РОДА СТРИЖЕЙ, СЕМЕЙСТВА СТРИЖИНЫЕ.



СИЗЫЙ ГОЛУБЬ (ЛАТ. COLUMBA LIVIA) — ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПТИЦА СЕМЕЙСТВА ГОЛУБИНЫХ, РОДИНОЙ КОТОРОЙ СЧИТАЮТСЯ ЮЖНАЯ ЕВРОПА, ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА.



**ГРАЧ (ЛАТ. CORVUS FRUGILEGUS) — ШИРОКО
РАСПРОСТРАНЁННАЯ В ЕВРАЗИИ ПТИЦА РОДА ВОРОН.**



ЗИМУЮТ ГАЛКИ, ВОРОНЫ, СИНИЦЫ.

ГАЛКА (ЛАТ. CORVUS MONEDULA) — ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПТИЦА РОДА ВОРОНОВ. ДЛИНА 34—39 СМ, МАССА ТЕЛА 175—280 Г.



СЕРАЯ ВОРОНА - ТИПИЧНЫЙ СИНАНТРОПНЫЙ ВИД.



БОЛЬШАЯ СИНИЦА, ИЛИ БОЛЬШАК (ЛАТ. PARUS MAJOR) — САМЫЙ КРУПНЫЙ И НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В РОССИИ ВИДОВ СИНИЦЕВЫХ ПТИЦ

